



DIAGNÓSTICOS
DO BRASIL

Exame de **Papanicolau**

Requisição para Exame

Nome: _____

Idade: _____ Uso de DIU: _____

Última Menstruação: ____ / ____ / ____ Uso ACO ou TRH: _____

Dados Clínicos: _____

Hipótese Diagnóstica: _____

Coloscopia:
Teste de Schiller:



Exames Anteriores: _____

Cirurgia Ginecológica: _____

Radioterapia ou Quimioterapia: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura - Médico requisitante

Esta requisição faz parte do exame e deverá acompanhar o material coletado.

Instruções para Coleta

Sinônimos

Citopatológico cervical, colpocitológico, citológico cervical.

Material

Raspado cervical (ecto e endocervical).

Coleta

Confeccionar **uma lâmina** e enviar ao Laboratório. **Seguir rigorosamente a técnica** para a coleta do material. Enviar a requisição para exame **completamente preenchida**.

Técnica de Coleta

Pré-requisitos

A coleta deverá ser feita fora do período menstrual; poderá ser realizada durante sangramento, fora do período menstrual. Abstinência sexual de no mínimo 48 horas; não utilizar ducha, lavagem ou cremes vaginais até 48 horas antes da realização do exame.

Instruções para coleta


- Identificar a lâmina com as **iniciais** do nome da paciente usando **lápiz**.
- Origem do material: (C) Ectocervical: imprimir uma raspagem de área, com a espátula de Ayre, de forma firme porém sem causar sangramento, utilizando movimento de 360 graus, tendo como ponto de apoio o OE; (E) Endocervical: introduzir a escova endocervical no canal e imprimir um movimento de 360 graus.

Procedimento

1) **Retirar o excesso de secreção** com gaze, antes de coletar a amostra da ectocérvice.

2) Distender o material coletado sobre a lâmina, utilizando-se um único movimento, evitando a sobreposição de material. O espalhamento **deve ser rápido** para evitar dessecação. Evitar a formação de grumos e/ou áreas espessas, bem como, esfregado muito fino.

Espalhar sobre a mesma lâmina as coletas: C, E, em sentido horizontal/vertical, conforme ilustração abaixo:



3) Fixação em spray: **esta etapa é crítica**. Após a confecção do esfregado, aplicar **IMEDIATAMENTE**, à uma **distância de 20 cm**, uma camada do fixador sobre todo material; acondicionar as lâmina em frasco de transporte.

4) Identificar devidamente o frasco de transporte com o nome da paciente.

5) Encaminhar para o laboratório o frasco juntamente com a requisição de exame devidamente preenchida.