Diagnóstico laboratorial da infecção por HTLV-1/2*

Teste de Triagem

Quimioluminescência, Eletroquimioluminescência ou ELISA

Detectam a presença de anticorpos contra HTLV-1/2 sem discriminar entre os dois tipos de vírus

Não Reagente

Permanecendo a suspeita diagnóstica, repetir o exame em nova amostra após 3 meses, para avaliar a possibilidade de estar em fase de soroconversão

Reagente ou Indeterminado

Realizar teste Confirmatório

Molecular (PCR)

Reagente para HTLV-1 ou HTLV-2

Confirma a infecção por HTLV-1 ou HTLV-2

Não reagente

Sem infecção ou presença de DNA abaixo do limite de detecção do teste

Recomendado realizar exame sorológico Western blot ou Imunoblot para afastar a possibilidade de PCR falso-negativo

Recomendado realizar teste molecular ou repetir o teste sorológico (Western blot ou Imunoblot) em nova amostra após 3 meses

Sorológico (Western blot ou Imunoblot)

Indeterminado

Não reagente

Descarta Infecção HTLV 1/2

Reagente

Confirma a infecção HTLV-1 ou HTLV-2

***Indicações de testagem por HTLV estão no documento do Ministério da saúde.**

Link: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicaces/2022/guia_htlv_internet_24-11-21-2_3.pdf

Crianças até 18 meses de idade realizar teste molecular (PCR) para detecção do HTLV

DB DIAGNÓSTICOS

versão 01